

**AIRES DE CONSERVATION DES SÉBASTES**

# Vous pouvez protéger les sébastes de la Colombie-Britannique

Les espèces de sébastes côtiers vivent sur les récifs d'éponges siliceuses et ne s'éloignent pas de leur habitat. Un grand nombre d'entre eux peuvent vivre plus de cent ans! Ils sont particulièrement sensibles à la surpêche.

Les aires de conservation des sébastes (ACS) aident à protéger les populations de sébastes de la Colombie-Britannique contre la mortalité due à la pêche.

**La plupart des activités de pêche, qui incluent la pêche récréative au saumon et au flétan, sont interdites dans toutes les 164 ACS.**

**Les activités de pêche seulement autorisées sont:**


Pêche récréative	Pêche commerciale
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crabe, petite crevette et grande crevette récoltés au casier</li> <li>• Invertébrés récoltés à la main ou en plongée</li> <li>• Éperlan pêché au filet maillant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crabe, petite crevette et grande crevette récoltés au casier</li> <li>• Euphausiid (krill) pêché au chalut pélagique</li> <li>• Poissons de fond pêchés au chalut pélagique</li> <li>• Hareng pêché au filet maillant, à la senne, et pêche aux œufs sur varech</li> <li>• Invertébrés récoltés à la main ou en plongée</li> <li>• Saumon pêché à la senne ou au filet maillant</li> <li>• Sardine pêchée au filet maillant, à la senne et au casier</li> <li>• Pétoncle pêché au chalut</li> <li>• Éperlan pêché au filet maillant</li> </ul>
Pêches autochtones à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les instances dirigeantes des communautés autochtones prennent les décisions relatives à la récolte et à la conservation des prises dans le cadres des allocations ASR</li> </ul>	



▲ Sébaste-tigre

## Protéger les habitats fragiles

Certaines aires de conservation des sébastes (ACS) chevauchent des aires de conservation des récifs d'éponges siliceuses où toutes les activités de pêche de fond sont interdites (notamment la pêche à la petite crevette, à la grande crevette et au crabe). Les engins de pêche et les ancres de bateau peuvent détruire les habitats fragiles des sébastes. Pour en apprendre plus, veuillez-vous rendre sur le site: [Canada.ca/fermetures-eponges-siliceuses](https://Canada.ca/fermetures-eponges-siliceuses)



COLOMBIE-BRITANNIQUE

**Aires de conservation des sébastes**



## AIRES DE CONSERVATION DES SÉBASTES

# Espèces de sébastes côtiers



**Sébaste aux yeux jaunes**  
(*Sebastes ruberrimus*)

Mesure jusqu'à 91 cm. Jaune-orange, rouge-orangé à rouge foncé avec des yeux jaune vif. Les juvéniles sont rouges avec 2 bandes claires.



**Sébaste à bandes jaunes**  
(*Sebastes nebulosus*)

Mesure jusqu'à 45 cm. Corps noir, tacheté de jaune et de blanc. Rayure jaune vers le bas de la nageoire dorsale qui revient le long de la ligne latérale.



**Sébaste à dos épineux**  
(*Sebastes maliger*)

Mesure jusqu'à 64 cm. Brun foncé à noir moucheté avec des zones pâles sur la tête et/ou sous la nageoire dorsale supérieure, la nageoire dorsale épineuse est profondément échancrée. Taches rousses sur la tête et/ou sous la mâchoire inférieure, particulièrement lorsqu'ils sont juvéniles.



**Sébaste-tigre**  
(*Sebastes nigrocinctus*)

Mesure jusqu'à 61 cm. Corps rose, blanc à brun rouge avec 5 bandes verticales rouge foncé ou noires et 2 bandes partant des yeux.



**Sébaste cuivré**  
(*Sebastes caurinus*)

Mesure jusqu'à 66 cm. Brun à cuivré avec des taches roses ou jaunes. Rayure pâle sur les deux derniers tiers du corps le long de la ligne latérale.



**Sébaste noir**  
(*Sebastes melanops*)

Mesure jusqu'à 69 cm. Corps allongé noir bleuté avec des taches noires, un ventre blanc ou gris et des taches blanches ou grises entre la nageoire dorsale et la ligne latérale.

## Faits intéressants sur les sébastes et les aires de conservation des sébastes

- De nombreuses espèces de sébastes ont une croissance lente et une longue durée de vie; les sébastes aux yeux jaunes et à dos épineux peuvent atteindre respectivement 115 et 95 ans.
- Les stocks de sébastes côtiers sont peu abondants en Colombie-Britannique.
- Les femelles plus âgées sont essentielles à la reconstitution de la population de sébastes car ce sont elles qui produisent le plus de larves.
- Contrairement au saumon, les sébastes ont des vessies natatoires fermées et ne survivent généralement pas après avoir été capturés puis relâchés. Ils ne peuvent pas s'ajuster aux changements rapides de pression lorsqu'ils sont ramenés à la surface.
- Des ACS ont été créées pour protéger une partie des populations de sébastes côtiers contre la mortalité causée par la pêche, notamment les populations de sébastes aux yeux jaunes, à dos épineux, tigres, à bandes jaunes, cuivrés et noirs.
- Les 164 ACS situées le long de la côte de la Colombie-Britannique couvrent environ 4 800 km<sup>2</sup> d'habitats côtiers, notamment les récifs de roches et d'éponges siliceuses, les forêts de varech et les herbiers de zostères.



**Attendez-vous à des** Restrictions de pêche pour aider à reconstruire les sébastes en déclin



**Protégez** Les sébastes côtiers et leur habitat



**Respectez** Les aires de conservation des sébastes

Pour en apprendre plus sur les aires de conservation des sébastes, veuillez-vous rendre sur le site: [dfo-mpo.gc.ca/conservation-des-sebastes](https://dfo-mpo.gc.ca/conservation-des-sebastes)

Ligne directe d'Observez, Notez, Signalez: 1-800-465-4336

LOCALISEZ LES ACS SUR VOTRE  
TÉLÉPHONE PORTABLE, ACTUELLEMENT  
SUR L'APPLICATION FISHINGBC DE  
SPORT FISHING INSTITUTE (INSTITUT  
DE LA PÊCHE RÉCRÉATIVE)  
ACS VER 03/18

