

Le rapport de surveillance

Le 01 septembre, 2025

Des prévisions quotidiennes portant sur 10 jours, relatives aux températures et au débit de l'eau dans la partie aval de la fleuve Fraser, ainsi que les conditions actuelles au travers du bassin sont mises à jour tous les 15 jours à partir de fin juin à mi-août. Ces prévisions à court terme sont générées en utilisant les modèles de prévision du débit des rivières (Hague and Patterson 2014).

Les dernières recherches sur la migration en eau douce du saumon du Pacifique suggèrent qu'il existe des différences de seuil de tolérance aux températures et débits propres à chaque population (Eliason et al. 2011). Ces différences font certainement référence à la variabilité en matière de conditions environnementales moyennes en rivière subies par les saumons entamant leur migration d'eau douce à différentes périodes de l'année et selon différentes voies (Farrell et al. 2008). Malgré ces différences, il existe aussi des seuils pour l'ensemble des espèces qui engendreront des difficultés de migration pour la plupart des populations de saumons rouge de la fleuve Fraser. Nous fournissons le niveau du seuil spécifique à chaque espèce comme un guide pour interpréter l'effet potentiel des conditions courantes et prédites de températures et de débit sur les saumons migrants. Cependant, en général, les poissons remontant la fleuve Fraser en milieu d'été sont historiquement plus tolérant aux températures élevées que ceux retournant plus tôt, en fin d'été ou au début de l'automne.

Température actuelle		
août 31, 2025	La moyenne quotidienne	moyenne historique
Stuart River @ Fort St. James	20.8	16.3
Stellako River @ Glenannan	20.2	16.6
Nautley River @ Fort Fraser	21.0	15.9
Nechako River @ Vanderhoof	20.6	15.8
Nechako River @ Isle Pierre	21.0	16.4
Bowron River @ Box Canyon	18.2	NA
Fraser River @ Shelley	NA	13.3
Quesnel River @ Quesnel	18.8	16.4
Fraser River @ Marguerite	19.4	16.3
Chilcotin River @ Hanceville	17.3	14.4
Fraser River @ Texas Creek	NA	16.4
North Thompson River @ McLure	18.2	14.6
South Thompson River @ Chase	22.2	19.0
Thompson River @ Ashcroft	20.3	17.9
Fraser River @ Qualark	20.5	16.6

**La température de l'eau de Nechako R @ Isle Pierre a été calculée à l'aide d'un modèle de mélange*


Le débit du Fleuve Fraser à Hope

Niveaux critiques pour la migration du saumon par le Canyon du Fraser:

7000 m.c.s. - Premiers signes de stress physiologique évidents.

8000 m.c.s. - Migration difficile retardant le temps de migration.

9000 m.c.s. - Barrière à la migration par le Hell's Gate.



Températures du fleuve Fraser à Qualark

18°C - Performance de nage diminuée

19°C - Premiers signes de stress physiologique et de migration ralentie

20°C - Associé aux taux de mortalité élevés pré-frai et à la maladie

21°C - L'exposition chronique peut mener au stress sévère et à la mortalité précoce.

● 2025 vérité ○ 2025 prédit - la plus élevée (1950-2024) — moyenne historique +/- 1 SD (1950-2024)

